

Your Vitamines Rode Rijst

Totaal formule

Hart, bloedvaten, cholesterol

Ingrediënten per capsules		aanbevolen dagelijkse dosering	RI in%
Vitamine B1 (Thiamine)	0,17 mg	0,17 mg	15,5 %
Vitamine B11 (Foliumzuur)	400 µg	400 µg	200 %
Vitamine C (Ascorbinezuur)	12 mg	12 mg	15 %
Vitamine D Qauli-D®	25 µg	25 µg	250 %
Vitamine K2 (MEMAQ 7)	37,5 µg	37,5 µg	50 %
Monacolin K (uit rode rijst)	10 mg	10 mg	
Co-Enzym Q10	10 mg	10 mg	
Zwarte Knoflook (ABG10+®)	90 mg	90 mg	
Olea Europea extract	250 mg	250 mg	
Fruitblend	10 mg	10 mg	
Groentebled	10 mg	10 mg	

RI in %=Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene in %

Ingrediëntendeclaratie:

Vitaminen, Monacolin K, Co-Enzym Q10, Zwarte knoflook (absoluut reukloos), Olea Europea (olijfblad), Groente- en Fruit blend, HPMC (capsulehuls).

Ingrediëntendeclaratie. vitamine B1, foliumzuur, vitamine C, vitamine D3, vitamine K2, monacolin K (Monascus Purpureus uit rode rijst), co-enzym Q10, zwarte knoflook (absoluut reukloos) Olea Europea (olijfblad) fruitmix, groentemix, olijfolie, tri-calcium-fosfaat en vegetarische HPMC capsule.

Groentemix van: wortel, broccoli, champignon, prei en paprika.

Fruitmix van: ananas, sinaasappel, appel, abrikoos, kers, perzik, aardbei, papaja, druif, pompelmoes, blauwe bosbes, framboos, zwarte best en witte moerbeï.

Monacolin K1 uit rode gistrijst, olijfblad², thiamine³, vitamine C⁴

Voedingssupplement. vitaminepreparaat.

Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.

Dosering en Gebruik: De aanbevolen dosering is 1 capsules per dag met water en bij voorkeur tijdens een maaltijd innemen, tenzij uw therapeut of medisch adviseur u anders adviseert. Droog en bij kamertemperatuur en buiten bereik van kinderen bewaren.

Aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden.

Let op: Monacoline K wordt omgezet door het CYP3A4-enzym in de lever. Rode Rijst kan een wisselwerking hebben met medicijnen die invloed hebben op dit enzym, tevens wordt gelijktijdig gebruik van statines afgeraden.

Niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding en niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar. Overleg bij gebruik van cumarine derivaten (antistollingsmiddelen zoals warfarine) eerst met een deskundige alvorens een vitamine k2 supplement te gebruiken.